




BOCIAN CZARNY

(*Ciconia nigra*)

Bocian czarny podlega ochronie ścisłej, a wokół gniazd wyznaczone są strefy ochrony całorocznej i okresowej. Dokładna lokalizacja gniazd jest objęta tajemnicą, by chronić ptaki przed intruzami. W program ochrony i monitoringu populacji tego gatunku zaangażowani są leśnicy i ornitolodzy z całej Polski.

Bocian czarny to rzadki gatunek. Zasiedla Palearktykę od Półwyspu Iberyjskiego po wschodnie krańce Rosji i Chin. Ponadto izolowana populacja zasiedla Afrykę południową. Europejskie bociany czarne zimują w Afryce na południe od Sahary, a azjatyckie – na południu Azji.



Na przełomie XIX i XX wieku bocianów czarnych w Polsce było bardzo niewiele. W 1966 r. ich liczebność szacowano na 500–530 par lęgowych. Dzięki ochronie, wysiłkom leśników, naukowców i miłośników przyrody, udało się stworzyć tym ptakom odpowiednie warunki do gniazdowania. Aktualnie liczebność bociana czarnego w Polsce szacowana jest na **1400–1600 par.**

To gatunek typowo leśny. Unika sąsiedztwa człowieka. **Gniazda buduje na okazałych drzewach**, głównie dębach, na wysokości kilkunastu metrów od ziemi.



rozpiętość skrzydeł do **145–155 cm**



wysokość do **95–100 cm**

masa ok. **3 kg**

oko o brązowej tęczówce okala naga czerwona skóra

czerwony dziób

upierzenie czarno-brązowe z zieloną opalizacją

wierzch czarno-brązowy z zielonym połyskiem

sterówki czarne, pokrywy podogonowe białe

nogi czerwone

♀♂

dziób oliwkowo-szary

upierzenie biało-brązowe

nogi szaro-oliwkowe

młode



Realizowany od 2016 roku projekt edukacyjny **Bociany Czarne Online** ma odsonić tajemnice życia tego gatunku. Transmisja online z gniazda to wspólny projekt edukacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Transmisja online:
lodz.lasy.gov.pl/bociany czarne

RDLP w Łodzi na Facebooku:
<https://www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz/>


! ZAGROŻENIA



Wrogowie naturalni to **jastrząb, bielik, kuna leśna oraz ryś**. Ptakom zagrażają również **kolizje z liniami energetycznymi**. Poza tym bociany czarne i białe w okresie wędrówek **są obiektem polowań** – głównie w Libanie i na Malcie.

OKRES LĘGOWY


Samica składa w kwietniu **2–5 białych jaj** (podczas wysiadywania nabierają zabrudzeń)



Wysiadywanie – oba ptaki: **32–35 dni**
Przez pierwsze trzy–cztery tygodnie życia młode są strzeżone przez przynajmniej jednego z rodziców, a karmione przez obydwójce. Pisklęta opuszczają gniazdo na przełomie lipca i sierpnia w wieku ok. 70–80 dni.

Pisklęta bociana czarnego po wykluciu są pokryte delikatnym białym puchem.

Bociany czarne **w czasie jednego sezonu są ptakami monogamicznymi**. W kolejnych sezonach może dochodzić do zmiany partnerów. Każda para buduje zwykle więcej niż jedno gniazdo, które mogą być oddalone o siebie nawet o kilka kilometrów.



Pisklęta i osobniki dorosłe odżywiają się głównie **niewielkimi rybami**. Uzupełnieniem pokarmu są płazy oraz drobne bezkręgowce. Dorosłe ptaki zdobywają pokarm brodząc w płytkich śródleśnych ciekach.

