

WĘŻE

Gniewosz plamisty

Aktywny najbardziej w ciągu dnia.

głowa słabo wyodrębniona z płamą w kształcie litery V

jednobarwny, szarobrzązowy lub rdzawobrzązowy, czasem układ plamek może łudząco przypominać zygzak żmii

plama przebiegająca przez tęczówkę

czarny pasek przebiegający z boku - od nozdrzy, przez oko, aż do szyi

Żmija zygzakowata

Jest jedynym jadowitym wężem w Polsce, jednak atakuje **wyłącznie**, kiedy jest osaczona i nie ma drogi ucieczki. Nawet jeśli ukąsi, to rzadko dochodzi do zgonu (1% w skali Europy). Aktywna najbardziej o zmierzchu i w nocy.

trójkątny kształt głowy

widoczny zygzak

piónowa żrenica

Odmiany żmii zygzakowatej:

brązowa, czerwona

szara

czarna



Wąż Eskulapa

Największy wąż w Polsce, osiągający długość ponad 2 m.

wąska, wydłużona głowa, słabo odznaczona od tułowia

jasne plamy za głową, które z wiekiem bledną, podobne do plam zaskronców, ale bez czarnego obrzeża

podgardle i spód ciała jasnożółte

ubarwienie jednolite, jasnobrzązowe, oliwkowobrzązowe lub miedzianobrzązowe

Zaskroniec

wyraźnie wyodrębniona głowa

zwykle charakterystyczne dwie żółte plamy za skroniami, podkreślone czarnym obrzeżem

ciało oliwkowozielone z podbrzuszem białym do bladożółtego, poprzecinane czarnymi poprzecznymi paskami

Padalec

Nie jest wężem, a **beznogą jaszczurką**. W przeciwieństwie do węży ma:

- powieki
- lekko zaznaczoną szyję
- tarczki brzuszne takie same jak tarczki grzbietowe (u węży są ułożone poprzecznie)

głowa zlewa się z ciałem

ciało jednolicie ubarwione w kolorze miedzianym lub srebrnym

